

Síntomas en el hombre: aparecen secreciones transparentes que se vuelven luego cremosas, así como muchas ganas de orinar y dolor.

Tratamiento específico con antibióticos, si no se atiende a tiempo puede provocar esterilidad en los hombres y mujeres.

• **Herpes Genital** •

Esta infección se produce por el Virus del Herpes Simple (VHS) y se transmite por vía sexual.

Los principales síntomas: úlceras (pequeñas ampollas), picazón, fuerte dolor localizado en los genitales, dolor y picazón al orinar, fiebre y malestar similar de la gripe.

No existe cura para el herpes, solo hay paliativo. El virus se transmite con mayor eficacia mientras hay lesiones presentes además permite una mayor transmisión del VIH.

• **Tricomonirosis** •

Las tricomonas vaginales son protozoos (Tricomonas vaginales), que afectan a las mujeres. El hombre puede adquirir esta infección pero sin embargo, no presenta ningún síntoma.

Síntomas para mujeres: secreción vaginal espumosa de aspecto amarillento y mal olor e irritación. Existen tratamientos muy eficaces.

• **Hepatitis B** •

Es una enfermedad del hígado provocada por el virus de la Hepatitis B, que se encuentra en la sangre, fluidos corporales y en la saliva.

Síntomas: cansancio, pérdida de apetito, fiebre, vómito y dolor de las articulaciones, urticaria o ronchas. La orina puede llegar a oscurecerse. No existe tratamiento para esta enfermedad, solo vacuna preventiva.

• **Pediculosis Pubica (Ladillas)** •

Son parásitos, Phthirus pubis (piojos pubicos), que viven en las partes vellosas del cuerpo. Chupan la sangre y ponen huevos en las raíces del vello.

Provocan molestias e intensas picazones en las zonas afectadas y pueden adquirirse mediante el contacto sexual directo con una persona infectada o compartir toallas o sábanas. Su tratamiento es eficaz y rápido.

¿Qué hacer cuando sospechas de una ITS?

- No debes iniciar un tratamiento por tu cuenta o recomendado por amigos.
- No debes consultar a personas que no sean profesionales de la salud.
- No debes mantener relaciones sexuales penetrativas sin el uso correcto del condón masculino o femenino.
- Debes consultar al médico y realizar el tratamiento prescrito como ha sido indicado.
- Debes hablar con tu/s parejas sexuales y sea/n ocasionales o permanentes y advertirle/s que vaya/n al médico.

¿Qué puedes hacer cuando sospechas que tienes una ITS?

- Aclarar tu situación de salud en una consulta médica señalando claramente las molestias, aquello que te parece extraño y las dudas en general.
- Cumplir con las indicaciones de exámenes por realizar y el tratamiento de medicamentos prescrito incluyendo a tus hábitos diarios.
- Dialogar con tu/s pareja/s sexual/es a fin de evitar contraer y/o readquirir una ITS.
- Evitar el contacto directo con mucosas o zonas con lesiones de tu pareja sexual.

¿A que síntomas deberías estar atento?

- Herida, úlcera, ampolla o secreción en la boca, genitales o ano
- Dolor al tener relaciones sexuales penetrativas o al orinar
- Comezón o ardor en genitales o ano
- Todo aquello que te parezca extraño o poco habitual en tus zonas erógenas

Création : www.presscode.fr - 04 96 11 05 80 année 2007

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

Para obtener más información
contactar Arcat

94-102, rue de Buzenval

75020 Paris

Tél. : 01 44 93 29 29

Fax : 01 44 93 29 30

E-mail : hispano@arcat-sante.org



www.arcat-sante.org

Con el apoyo de l'Inpes

