

1^{er} décembre 2005

Journée mondiale de lutte contre le sida

Ne banalisons pas le sida !

Les traitements ne sont pas anodins !

- ▶ Les multithérapies, c'est 4 à 20 comprimés à prendre tous les jours à heure fixe ;
- ▶ des effets secondaires lourds ;
- ▶ la nécessité de changer de traitement lorsque celui-ci devient inefficace.

En France

Le nombre de personnes contaminées augmente et tout le monde est concerné.

Environ 6 000 personnes ont été contaminées par le VIH en 2004.

On estime à 120 000 le nombre de personnes séropositives.

La quasi totalité des postes de travail peut être tenue par des salariés atteints du VIH sans risque pour leur santé ou celle de leurs collègues.



Rappels

Le VIH, responsable du sida, peut se transmettre :

lors de rapports sexuels non protégés ;

lors d'échanges de seringues ;

lors de transfusions sanguines (cependant, en France et depuis 1985, tous les dons du sang sont testés ;

de la mère à l'enfant, dans certains cas, si la mère est contaminée.

Il n'y a aucun risque de transmission par l'air (comme pour le virus de la grippe), ni par les aliments, ni par les piqûres d'insectes.

Arcat

94-102, rue de Buzenval

75020 Paris

Tél.: 01 44 93 29 29



www.arcat-sante.org