

**Antes de chuparle a un cliente o a un desconocido sin preservativo**  
**¡Recuerda que la salud es un tesoro !**

**Recomendaciones en caso de chupar sin preservativo :**

- No cepillar tus dientes una hora antes de chupar o después, ya que irrita tus encías y esto facilita la entrada de muchas infecciones.
- Evitar el uso de hilo dental o palillos para limpiar los dientes después de comer.
- Si tus encías están inflamadas, tienes dolor en tus dientes o sospechas tener una infección (llaga bucal) evita chupar sin preservativo
- Recibir el semen directamente en la boca, los ojos o el ano aumenta el riesgo de contagió del VIH y otras infecciones sexualmente transmisibles.
- Una visita al dentista cada 6 meses es recomendable.
- Mantener una buena higiene de tus manos (límpialas con agua y jabón).
- Pensar en vacunarse contra la Hepatitis B.



**Para tener mas información**

El pasaje Latino 17 (Arcat):  
11, Passage Saint Michel - 75017 Paris  
Métro: La Fourche (Línea 13)  
Tél.: 01 42 93 05 78  
de lunes a jueves:  
9h à 13h y de 14h à 18h.

prevention@arcat-sante.org  
www.arcat-sante.org


Acceptess-T:  
39 bis, Boulevard BARBES  
Métro Château Rouge ligne 4  
Tél.: 01 42 29 23 67 / 06 73 37 95 67

acceptess-t@hotmail.fr  
https://m.facebook.com/acceptess.transgenres

**ACCEPTESS-T** 

 **ARCAT**

**¿TU CHUPAS ?**



**¡Disfrutarlo, informarse y Cuidarse!**

**¡ Por placer o en el  
trabajo sexual !**

Estas informaciones pueden ayudarte a prevenir la contaminación del VIH y otras infecciones sexualmente transmisibles (IST) como la Sífilis.

## ¿Qué es la sífilis?


La sífilis es una (IST) que puede causar complicaciones a largo plazo si no se trata de manera adecuada. Además puede facilitar y aumentar la transmisión del VIH, del herpes genital, de las infecciones por papiloma-virus, de la gonorrea, de la clamidia, ...

## ¿Es frecuente?

Si, sobre todo cuando se practica sexo sin protección con diferentes pajas sexuales.

## ¿Cómo se transmite?

Muy fácilmente, cuando chupas o lames el pene, la vagina o el ano sin preservativo.



## ¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas están divididos en tres fases.

### Primera Fase

2 o 3 semanas después de estar contaminado, puede aparecer una pequeña llaga indolora (chancro) en el sexo, el ano, la boca o la garganta y una erupción en la piel y las mucosas. Puede que todo desaparezca pero la infección ya estará en el cuerpo.

### Segunda Fase

Se puede ver aparecer:

- una erupción de puntos duros, de color rojo o marrón rojizo en la palma de las manos, en la planta de los pies y/o en otras áreas del cuerpo
- reaparición de heridas en la boca, la vagina o el ano
- fiebre
- inflamación de las glándulas linfáticas

### Tercera Fase

Varios años desde que comenzó el infección pueden aparecer daños neurológicos:

- dificultad para coordinar los movimientos musculares
- parálisis entumecimiento
- ceguera y demencia (trastorno mental)

## ¿Hay cura?

Sí, la sífilis se puede curar con los antibióticos correctos recetados por un médico.

Sin embargo, el tratamiento no revertirá ningún daño que la infección haya ya causado.

## ¿Cuándo y dónde consultar al médico?

Si ves la aparición de algunos síntomas y si últimamente has tenido prácticas sexuales orales o penetrativas sin protección, habla con una asociación, con tu médico de confianza o dirígete al CEGIDD (centro de información y de diagnóstico gratuito). Si tienes dudas y no conoces tu estado serológico al VIH y toda otra IST, en un CEGIDD también recibirás la información y el apoyo médico para hacer un chequeo global de tu salud sexual..

## ¿Chupar o no chupar con la sífilis?

Si actualmente estas infectado con la Sífilis y aunque estés recibiendo un tratamiento antibiótico, recuerda que tú puedes infectar a otras personas si no utilizas preservativo para chupar o para la penetración. Te recomendamos comunicarlo a tu pajas sexuales.



Aunque ya hayas terminado un tratamiento para la sífilis, siempre puedes volver a contaminarte de nuevo.

## ¿En caso de ruptura del preservativo?

Exista un tratamiento de urgencia que reduce altamente el riesgo de contagio. Lo más pronto posible y dentro de las primeras 48 horas, habla con una asociación o acude al servicio de urgencias del hospital más cercano. Di enseguida que has tenido una relación sexual de alto riesgo de contagio al VIH para recibir el tratamiento antirretroviral TPE (Traitement Post Exposition) que reduce altamente el riesgo de contaminación.

Evita la automedicación de antibióticos ya que esto puede agravar la situación.

La sífilis puede deteriorar el sistema inmunológico de las personas viviendo con el VIH.