



**1^{ER} DÉCEMBRE 2017
JOURNÉE MONDIALE
DE LUTTE CONTRE LE VIH
ET LES IDÉES REÇUES**

U=U
UNDETECTABLE = UNTRANSMISSIBLE
Indéfectable = Intransmissible

Chez une personne vivant avec le VIH prenant régulièrement son traitement, le virus devient indéfectable dans le sang et le risque de transmission du VIH par rapport sexuel – même sans préservatif – diminue drastiquement jusqu'à devenir proche de zéro. De nombreux couples sérodifférents (un partenaire séropositif, l'autre séronégatif) vivent ainsi sereinement leur sexualité.

Bonjour... Vous... vous êtes certaine d'avoir mal aux dents ?

Non mais sérieusement?! Vous en êtes encore là en 2017?!

8% des personnes vivant avec le V.I.H. déclarent avoir subi des discriminations dans le domaine de la santé.

Pss pss pss... Non!

6% des personnes vivant avec le V.I.H. déclarent avoir subi des discriminations en milieu professionnel.

Pfff... et dire que ces gens-là peuvent se marier maintenant!

En 2016, les LGBTphobies ont continué de progresser selon le rapport annuel de S.O.S. Homophobie.



Mon papi c'est le plus fort!

Il est très fort puisque comme 11% des personnes vivant avec le V.I.H., Papi a subi des discriminations au sein de sa famille.

POUR TOU.TES!

Le préservatif reste l'outil de prévention essentiel, à utiliser avec le lubrifiant, pour se protéger contre les IST* et le VIH.

*IST : infections sexuellement transmissibles

Le dépistage VIH et IST :

Connaître son statut par rapport au VIH et aux IST permet d'adapter ses pratiques sexuelles et sa prévention pour se maintenir en bonne santé et préserver celle de ses partenaires. C'est aussi essentiel pour accéder rapidement à un traitement efficace en cas de résultat positif.

QUAND ON EST SÉRONÉGATIVE ET TRÈS EXPOSÉ.E AU VIH

Il est possible de :

- prendre un **traitement préventif** pour éviter l'infection lors de rapports sexuels, appelé le traitement Pré Exposition (PrEP).
- prendre un **traitement d'urgence** juste après une prise de risque élevée (dans les 4 h ou au plus tard dans les 48 h). Ce traitement est aussi appelé le Traitement Post Exposition (TPE).

QUAND ON EST SÉROPOSITIF.VE ET QU'ON BÉNÉFICIE D'UN SUIVI MÉDICAL RÉGULIER

Le traitement anti-VIH pris de manière efficace protège les partenaires lors des rapports sexuels même sans préservatif. La charge virale (quantité de virus dans le sang) devient indéfectable, empêchant la transmission du VIH par rapport sexuel (U=U).

Jeromeuh 17

Un grand merci à Jeromeuh pour sa participation!



Info-vih@arcat-sante.org
94-102, rue de Buzenval
75020 Paris
Tél : 01 44 93 29 29
www.arcat-sante.org

Sida Info Service
0 800 840 800
www.sida-info-service.org